

BIGUANELLE® GEL

Dermatologisches Gel, pH 4,0 - Tube mit 30 ml

ZUSAMMENSETZUNG

Hydroxyethylcellulose	2,50 g
Glycerol	2,00 g
Kaliumchlorid	0,20 g
Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid (PHMB)	0,15 g
Natriumedetat	0,15 g
Milchsäure	0,01 g
gereinigtes Wasser	auf 100 ml

KATEGORIE

Medizinprodukt

EIGENSCHAFTEN

Biguanelle® Gel schützt Haut und Schleimhäute bei Erkrankungen und sorgt für eine optimale Regeneration, auch bei geschädigter Haut. Das Produkt beinhaltet Polyhexanid (PHMB), enthält keine Duftstoffe und der pH-Wert liegt bei 4,0.

DARREICHUNGSFORM

Dermatologisches Gel

KLINISCHE ANGABEN

ANWENDUNGSGEBIETE

Gel zur Behandlung von Vulvitis und Balanitis, dessen Wirkung auf der Wiederherstellung des natürlichen pH-Wertes an den behandelten Stellen und der damit einhergehenden verminderten Vermehrung von pathogenen Keimen beruht, auch im Fall von Läsionen. Aufgetragen auf Schleimhäute oder (auch verletzte) Haut schützt Biguanelle® Gel dank seines Abwehreffektes die behandelte Fläche vor Sekundärinfektionen und unterstützt den Heilungsprozess und die Wiederherstellung der physiologischen Bedingungen.

GEGENANZEIGEN

Bekannte Überempfindlichkeiten gegen einen der Inhaltsstoffe.

NEBENWIRKUNGEN

In einigen Fällen ist das Auftreten von Intoleranz möglich (Brennen oder Reizung), was jedoch nicht besorgniserregend ist und auch keine Änderung der Behandlung erforderlich macht. Bei allen Nebenwirkungen, die im Verdacht des Zusammenhangs mit der Verwendung des Produktes stehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

UNVERTRÄGLICHKEITEN

Keine.

VERKEHRSTÜCHTIGKEIT UND DAS BEDIENEN VON MASCHINEN

Biguanelle® hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Sofern keine anderen Anweisungen durch den Arzt gegeben wurden wird empfohlen, das Gel 1 bis 2 mal am Tag (morgens und abends) leicht einmassierend auf die zu behandelnde Fläche über einen Zeitraum von mindestens 7 Tagen aufzutragen.

WARNHINWEISE

Der Gebrauch aller Produkte zur topischen Verwendung, besonders über einen längeren Zeitraum, kann zu einer allergischen Reaktion führen. In diesem Fall sollte die Behandlung abgebrochen und ein Arzt für eine anderweitig geeignete Therapie-maßnahme aufgesucht werden. Unter normalen Anwendungsbedingungen sind keine Schäden durch Überdosierung bekannt. Bei Allergien gegen einen der Bestandteile sollte das Produkt nicht angewendet werden. Eine Anwendung während der Schwangerschaft sollte nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Nach Ablauf des auf der Verpackung sichtbaren Haltbarkeitsdatums das Produkt nicht mehr anwenden. Das Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Die Tube nach Gebrauch gut verschließen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht Schlucken.

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Bei Zimmertemperatur, vor Licht und Hitze geschützt aufbewahren.

INHALT DER PACKUNG

Tube mit 30ml

Datum der letzten Überarbeitung der Gebrauchsanweisung: 10.12.2019



Hersteller: Lo.Li. Pharma S.r.l. - Via Sabatino Gianni, 14 - 00156 Rom, Italien

Vertrieb: Marckyril Pharma GmbH - Hauptkanal links 36 - 26871 Papenburg

CE 0373

43201 0113

MC229 - P4797b1 IDG 12/20